



NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO - BARANJSKE
ŽUPANIJE

Služba za školsku medicinu



CIJEPLJENJE PROTIV HUMANOG PAPILOMA VIRUSA

Što je Humani papiloma virus?

Humani papiloma virus, skraćeno HPV, obuhvaća grupu od više od 150 tipova virusa, od kojih 40-tak uzrokuje bolesti kože i sluznice anogenitalne regije. Tipovi virusa označuju se brojevima.

Naziv dolazi od bradavica, lat. papiloma, koje uzrokuju neki od tipova virusa.

Određeni tipovi virusa mogu dovesti do nekih vrsta raka.

Sukladno navedenom, tipovi HPV-a se dijele se na:

“visokorizične”, onkogene tipove (16, 18, 31, 33, 45.....)

i “niskorizične”, neonkogene tipove (6, 11, 42, 43, 44....).

Koliko je učestala infekcija HPV-om?

Humani papiloma virus (HPV) je jedan od najčešćih uzročnika virusnih infekcija reproduktivnog trakta. Većina spolno aktivnih žena i muškaraca se zarazi u nekom trenutku u životu.

Kako se možemo zaštititi?

Prevenција infekcija HPV-om se dijeli na primarnu prevenciju koja obuhvaća zdravstveni odgoj (kasnije stupanje u spolne odnose, manji broj spolnih partnera, i dr.) i cijepljenje, te sekundarnu prevenciju – organizirani probir (engl. screening) žena na karcinom cerviksa (PAPA test) i HPV test.

Muškarci i HPV

Kod muškaraca je veća učestalost HPV infekcije nego kod žena, ali se one rjeđe otkrivaju i zato se muškarci smatraju važnim čimbenikom u širenju HPV-a u populaciji.

Cijepljenje protiv HPV-a

Cijepljenje učenica i učenika 8. razreda osnovne škole provodi se devetvalentnim cjepivom-Gardasil 9 (učenici i studenti do 25.godine starosti ovisno o raspoloživosti cjepiva-na upit).

Cjepivo sadrži sljedeće tipove HPV-a: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58.

Gardasil 9 je namijenjen cijepljenju protiv sljedećih bolesti uzrokovanih HPV-om:

- premalignih lezija i raka koji zahvaćaju vrat maternice (cerviks), stidnicu (vulvu), rodnicu (vaginu) kod ženskog spola i anus kod oba spola
- spolnih bradavica (Condyloma acuminata) kod oba spola uzrokovanih određenim tipovima HPV-a.



Više informacija možete pronaći u sažetku opisa svojstva lijeka na sljedećoj poveznici:

http://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/2018/20180219140172/anx_140172_hr.pdf

Cijepljenje protiv Humanog papiloma virusa (HPV-a) djevojčica i dječaka je preporučljivo radi smanjenja rizika od infekcije HPV-om i razvoja karcinoma.

Tijekom cijele školske godine mogu se cijepiti učenice i učenici 8. razreda osnovne škole.


Djevojčice i dječaci u dobi do uključujući 14 godina primaju dvije doze cjepiva u razmaku od šest mjeseci. Nakon petnaestog rođendana cjepivo se prima u tri doze. Preporučuje se razmak od dva mjeseca između prve i druge doze, te četiri mjeseca između druge i treće doze. Razmaci između doza mogu biti dulji, a preporučuje se sve tri doze primiti unutar 12 mjeseci.

Učenice i učenike cijepi nadležni liječnik školske i adolescentne medicine, a osobe odgovarajuće dobi koje nisu u školskom sustavu mogu se cijepiti u epidemiološkim ambulancama, gdje se mogu dobiti i sve informacije o dobrovoljnom i besplatnom cijepljenju.

POPIS NADLEŽNIH ŠKOLSKIH LIJEČNIKA, KONTAKT TELEFONE I RADNO VRIJEME MOŽETE PROVJERITI KLIKOM NA LINK:

<https://www.zzjosijek.hr/sluzba-za-skolsku-medicinu>

Drinska,8 Osijek



INFORMATIVNI LETAK O CIJEPLJENJU PROTIV HPV-a

→ https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2019/09/Letak-HPV-prva-i-druga-strana-2019-2020_.pdf

Ukoliko se odlučite za cijepljenje Vašeg djeteta protiv HPV-a, javite se nadležnom školskom liječniku. Na cijepljenje je potrebno ponijeti :

- zdravstvenu i cjepnu iskaznicu
- potpisan informativni letak

